

LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE SIN RECETA 2020

No.	Nombre Genérico	Concentración máxima	Forma Farmacéutica	Observaciones / Recomendaciones
AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS				
1	PROPINOX CLORHIDRATO	Hasta 20 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CÁPSULAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
2	PROPINOX CLORHIDRATO	10 mg / mL	SOLUCIÓN GOTAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
3	PROPINOX + CLONIXINATO DE LISINA	10 mg + 125 mg	TABLETAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
4	SIMETICONA	Hasta 125 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
5	SIMETICONA	Hasta 100 mg / mL	SUSPENSIÓN / SUSPENSIÓN EN GOTAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
AGENTES DE USO TÓPICO PARA EL TRATAMIENTO DE HEMORROIDES				
6	RUSCOGENINAS + PREDNISOLONA + CINCOCAINA CLORHIDRATO + MENTOL + OXIDO DE ZINC	0.8 g + 0.150 g + 0.500 g + 0.200 g + 10.0 g / 100 g	POMADA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
7	TRIBENÓSIDO + LIDOCAINA CLORHIDRATO	5 % + 2.12 %	CREMA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS				
8	ACEITE DE LINAZA	1000 mg	CÁPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
9	ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO + ÁCIDO DOCOSAHESAENOICO	180 mg + 120 mg	CÁPSULAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
10	OMEGA 3	1200 mg	CÁPSULAS BLANDAS DE GELATINA	No superar la dosis recomendada.
ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS				
11	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	Hasta 500 mg	CAPLETAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.
12	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	300 mg	SUPOSITORIO	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.
13	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	80 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.
14	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	160 mg / 5 mL	JARABE / SUSPENSIÓN	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.

15	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	100 mg / mL	SOLUCIÓN GOTAS ORALES	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.
16	ÁCIDO acetilsalicílico	500 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
ANESTÉSICOS LOCALES				
17	LIDOCAINA	5 g / 100 g	GEL TÓPICO/ UNGÜENTO TÓPICO	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
18	LIDOCAINA	100 mg / mL	SPRAY	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
19	LIDOCAINA + CLORURO DE BENCETONIO	3 % + 00.20 %	SPRAY	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
ANTI-ACNÉ				
20	ÁCIDO SALICÍLICO	30 g /100 g	POMADA / UNGÜENTO / GEL	Si persisten los síntomas busque atención médica.
21	ÁCIDO SALICÍLICO	1 g / 100 mL	SOLUCIÓN TÓPICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
22	ÁCIDO SALICÍLICO + AZUFRE PRECIPITADO	0.3 g + 1.08 g / 30 mL	SOLUCIÓN TÓPICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
23	ÁCIDO SALICÍLICO + AZUFRE + SULFATIAZOL	Hasta un 30% de Ácido Salicílico en esta combinación	POMADA DÉRMICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
24	AZUFRE	10 g / 100 g	JABÓN	No ingerir. Suspender si produce irritación.
25	PERÓXIDO DE BENZOILO	5 g / 100 g	GEL / JABÓN PASTA	No ingerir.
ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA				
26	LEVONORGESTREL	1.5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	Es un anticonceptivo de emergencia, no usar como método de planificación familiar de rutina. Debe ingerirse preferiblemente antes de las 72 horas después del coito, entre más cerca de la hora del coito es más eficaz. Puede tomarse hasta el 5to día (120 horas) pero la eficacia se reduce.
ANTIDIARREÍCOS				
27	LOPERAMIDA	2 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No usar en menores de 12 años. La dosis máxima es de 16 mg al día. Si luego de 2 días persisten los síntomas buscar atención médica. La medida terapéutica más importante es la administración de fluidos apropiados y la reposición de electrolitos (Sales de Rehidratación Oral).
28	LOPERAMIDA	2 mg / mL	SOLUCIÓN GOTAS ORALES	No usar en niños menores de 12 años. La dosis máxima es de 16 mg al día. Si luego de 2 días persisten los síntomas buscar atención médica. La medida terapéutica más importante es la administración de fluidos apropiados y la reposición de electrolitos (Sales de Rehidratación Oral).
29	SUBSALICILATO DE BISMUTO	87.5 mg / 5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
30	SUBSALICILATO DE BISMUTO	262.4 mg	TABLETAS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.
ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS				

31	DIMENHIDRINATO	50 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No debe utilizarse en niños menores de 2 años. Puede producir sueño. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
32	DIMENHIDRINATO	25 mg	SUPOSITORIO	No debe utilizarse en niños menores de 2 años. Puede producir sueño. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
33	DIMENHIDRINATO	15 mg / 5 mL	JARABE / SOLUCIÓN ORAL	No debe utilizarse en niños menores de 2 años. Puede producir sueño. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
34	PIRIDOXINA + DOXILAMINA	10 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS ENTÉRICOS	No superar la dosis recomendada.
ANTIFÚNGICOS DERMATOLÓGICOS				
35	ÁCIDO UNDECILENICO	19.06 g / 100 g	AEROSOL EN SUSPENSIÓN / SOLUCIÓN TÓPICA	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
36	BIFONAZOL	1%	CREMA	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
37	BIFONAZOL + UREA	1% + 40 %	UNGÜENTO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
38	CLOTRIMAZOL	2 g / 100 g	CREMA TÓPICA / GEL / POLVO / JABÓN PASTA	Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. No ingerir.
39	CLOTRIMAZOL + PARACLORXILENOL + DIFENHIDRAMINA + VITAMINA A + VITAMINA D3 + AVENA	Hasta concentración máxima de 1 % para el Clotrimazol	JABÓN PASTA	Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. No ingerir.
40	KETOCONAZOL	2 g / 100 g	POLVO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
41	KETOCONAZOL	1 g / 100 mL	SHAMPOO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
42	MICONAZOL	2%	POLVO / CREMA / SOLUCIÓN TÓPICA	No utilizar en niños menores de 2 años. Si persisten los síntomas luego de 5 días, buscar atención médica.
43	NISTATINA	100,000 UI / g	CREMA TÓPICA	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
44	TERBINAFINA BASE	1%	GEL	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
45	TERBINAFINA CLORHIDRATO	1%	CREMA / AEROSOL / SPRAY	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
46	TOLNAFTATO	1%	POLVO / CREMA / SOLUCIÓN	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
47	TOLNAFTATO + ALANTOINA	1 g + 0.2 g / 100 g	POLVO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
ANTIFÚNGICOS GINECOLÓGICOS				
48	CLOTRIMAZOL	500 mg	ÓVULO VAGINAL / TABLETA / COMPRIMIDO VAGINAL	Se debe consultar a un médico si los síntomas durante el tratamiento se mantienen después de 3 días, si se observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o sangrado.
49	CLOTRIMAZOL	1 g / 100 mL	SOLUCIÓN DE USO TÓPICO / SOLUCIÓN ATOMIZADORA	Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. No ingerir.
50	CLOTRIMAZOL	2 g / 100 g (2%)	CREMA VAGINAL / GEL	Se debe consultar a un médico si los síntomas durante el tratamiento se mantienen después de 3 días, si se observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o sangrado.
51	MICONAZOL	400 mg	ÓVULO	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
52	MICONAZOL	2 g / 100 g	CREMA VAGINAL	No utilizar en niños menores de 2 años. Si persisten los síntomas luego de 5 días, buscar atención médica.
ANTIHELMÍNTICOS				

53	ALBENDAZOL	200 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No se debe administrar Albendazol durante el embarazo o en mujeres que se sospeche embarazo. Consulte a su médico.
54	ALBENDAZOL	400 mg / 10 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No se debe administrar Albendazol durante el embarazo o en mujeres que se sospeche embarazo. Consulte a su médico. Niños entre 1-2 años la dosis es de 200 mg. Una dosis. Consulte a su médico.
ANTIHISTAMÍNICOS				
55	CETIRIZINA DICLORHIDRATO	10 mg	CÁPSULAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS	No usar en niños menores de 6 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
56	CETIRIZINA DICLORHIDRATO	5 mg / 5 mL	JARABE	No usar en niños menores de 6 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
57	CLORFENIRAMINA MALEATO	0.5 mg / mL	JARABE	Produce sedación. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
58	DIFENHIDRAMINA	50 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	Precaución al usarse conjuntamente con alcohol. Produce sedación, tomar antes de dormir. No deberá ser administrado durante un período superior a 7 días, ni a menores de 12 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
59	DIFENHIDRAMINA	12.5 mg / 5mL	JARABE / SOLUCIÓN ORAL	Produce sedación, tomar antes de dormir. No deberá ser administrado durante un período superior a 7 días, ni a menores de 12 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
60	FEXOFENADINA CLORHIDRATO	30 mg / 5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No usar en niños menores de 2 años. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
61	FEXOFENADINA CLORHIDRATO	120 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
62	HIDROGENOSUCCINATO DE DOXILAMINA	25 mg	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	No superar la dosis recomendada. No se debe administrar durante el embarazo o en mujeres que se sospeche embarazo.
63	LORATADINA	10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debe evaluarse la situación clínica del paciente.
64	LORATADINA	5 mg / 5 mL	JARABE / SOLUCIÓN ORAL	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debe evaluarse la situación clínica del paciente.
65	LORATADINA	1 mg / mL	SOLUCIÓN GOTAS	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debe evaluarse la situación clínica del paciente.
ANTIMIGRAÑOSOS				

66	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + ÁCIDO acetilsalicílico + CAFEÍNA	250 mg + 250 mg + 65 mg	CAPLETAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. No debe ingerirse alcohol en concomitancia al uso de este medicamento, ya que incrementa los efectos adversos gastrointestinales del ácido acetilsalicílico y es un factor desencadenante en la irritación crónica producida por el ácido acetilsalicílico. La utilización del ácido acetilsalicílico en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas -cerveza, vino, licor, ...-al día) puede provocar hemorragia gástrica. Su uso puede afectar el sueño y el reposo normal.
67	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CAFEÍNA	Hasta 500 mg + 65 mg	CAPLETAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento y en pacientes que no tengan insuficiencia hepática. Su uso puede afectar el sueño y el reposo normal.
68	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CAFEÍNA + ERGOTAMINA TARTRATO	Hasta 500 mg + 65 mg + 1 mg	CAPLETAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento y en pacientes que no tengan insuficiencia hepática. Su uso puede afectar el sueño y el reposo normal.
69	ACETAMINOFÉN + CARBONATO DE CALCIO + TIAMINA MONONITRATO + CAFEÍNA ANHIDRA	500 mg + 280 mg + 84 mg + 65 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada, si los síntomas persisten luego de 72 horas o empeoran antes, acuda a su médico. Puede producir somnolencia.
70	ÁCIDO acetilsalicílico + CAFEÍNA	650 mg + 65 mg	TABLETAS	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas, acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos a la ácido acetil salicilico.
71	ÁCIDO acetilsalicílico + BICARBONATO DE SODIO + CAFEÍNA	650 mg + 2500 mg + 65 mg	POLVO EFERVESCENTE	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. Este medicamento no debe emplearse como sustituto del sueño. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

72	IBUPROFENO + CAFEINA	Hasta 400 mg + 65 mg	CÁPSULAS	No usar conjuntamente con otros analgésicos, su uso prolongado puede producir problemas gastrointestinales o hepáticos. No ingerir más de 1,200 mg al día.
ANTIPRURIGINOSOS				
73	ACETATO DE ZINC DIHIDRATADO	5 mg / 5 mL	GEL	Si persisten los síntomas luego de la dosis recomendada busque atención médica.
74	ÁCIDO BÓRICO + CALAMINA + GLICERINA + MENTOL+ OXIDO DE ZINC + TALCO		LOCIÓN	Si persisten los síntomas busque atención médica.
75	CALAMINA		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
76	CALAMINA + DIFENHIDRAMINA		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
77	CALAMINA + ÓXIDO DE ZINC		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
78	CALAMINA + ÓXIDO DE ZINC + DIFENHIDRAMINA		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
79	PRAMOXINA + ACETATO DE ZINC	1 g + 0.1 g / 100 mL	LOCIÓN	No ingerir.
ANTISÉPTICOS Y ANESTÉSICOS OTOLÓGICOS				
80	ÁCIDO BÓRICO	2.75 g / 100 mL	SOLUCIÓN ÓTICA	No usar si hay sospecha de infección o secreciones. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
81	BENZOCAINA	20 mg / mL	SOLUCIÓN ÓTICA	No aplicar en sospecha de infección o si hay secreciones a través del oído. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES				
82	AGUA OXIGENADA	3% (10 VOLÚMENES)	SOLUCIÓN	Solo para uso externo. No ingerir.
83	ALCOHOL ETÍLICO	70% V/V	SOLUCIÓN	Solo para uso externo. No ingerir.
84	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	70% V/V	SOLUCIÓN DE USO TÓPICO	Solo para uso externo. No ingerir.
85	BENZALCONIO CLORURO	10 g / 100 g	PASTA JABÓN	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
86	BENZALCONIO CLORURO	0.5 g / 100 mL	SOLUCIÓN TÓPICA	No ingerir. Solo para uso externo.
87	BENZOCAINA + TRICLOSAN	0.500 g + 0.200 g / 100 mL	LOCIÓN TÓPICA	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
88	PARA CHLORO META XILENOL + FENOL LIQUIDO	0.1 g + 0.5 g	JABÓN PASTA	No ingerir. Solo para uso externo.
89	TRICLOSAN	0.1 g / 100 g	POLVO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
DIGESTIVOS, INCLUYENDO ENZIMAS				
90	LACTASA	45 mg	COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
91	PANCREATINA	400 mg	CÁPSULAS / TABLETAS / GRAGEAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten por más de 5 días consultar a su médico.
92	PANCREATINA + DIMETILPOLISILOXANO + BROMOPRIDE	400 mg + 80 mg + 5 mg	CÁPSULAS / TABLETAS / GRAGEAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten por más de 5 días consultar a su médico.
93	PANCREATINA + SIMETICONA	400 mg + 80 mg	CAPSULA / TABLETAS / GRAGEAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten por mas de 5 días consultar a su médico.
EMOLIENTES Y PROTECTORES				
94	ÓXIDO DE ZINC		LOCIÓN / CREMA DÉRMICA	No ingerir.
95	VITAMINA A PALMITATO + VITAMINA D3 + ÓXIDO DE ZINC		UNGÜENTO / CREMA	No ingerir. Solo para uso externo.
96	VITAMINA E + EXTRACTO DE ALOE		UNGÜENTO / CREMA	No ingerir. Solo para uso externo.
97	VITAMINA D3 + ÁCIDO BÓRICO+ ÓXIDO DE ZINC		0.0015 g + 1.40 g + 6.5 g / 100 g	CREMA
ESCABICIDAS				
98	PERMETRINA	Hasta 2 g / 100 mL	SHAMPOO / LOCIÓN / POMADA	No ingerir.
FÁRMACOS USADOS EN LA DEPENDENCIA A NICOTINA				
99	NICOTINA RESINATO	20 mg (Equiv. A 4 mg de Nicotina)	TABLETAS / COMPRIMIDOS DE GOMA MASTICABLE	No usar en menores de 18 años sin prescripción médica.
FÁRMACOS PARA ALTERACIONES RELACIONADAS CON LA ÁCIDEZ E INDIGESTIÓN				

100	ÁCIDO ACETILSALÍCILICO + BICARBONATO DE SODIO + ÁCIDO CÍTRICO	500 mg + 2000 mg + 2000 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Este medicamento no debe emplearse como sustituto del sueño. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
101	ÁCIDO ACETILSALÍCILICO + CAFEÍNA + BICARBONATO DE SODIO + ÁCIDO CÍTRICO	500 mg + 65 mg + 2000 mg + 2000 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Este medicamento no debe emplearse como sustituto del sueño. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
102	ALGINATO DE SODIO + BICARBONATO DE SODIO	2.67 g + 2.50 g / 100 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
103	ALGINATO DE SODIO + BICARBONATO DE SODIO + CARBONATO DE CALCIO	0.5 g + 0.2670 g + 0.16 g / 10 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
104	BICARBONATO DE SODIO	2.3 g / 5 g	POLVO EFERVESCENTE PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
105	BICARBONATO DE SODIO + CARBONATO DE MAGNESIO + CARBONATO DE CALCIO	100 mg + 75 mg + 100 mg	CÁPSULAS	Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana.
106	BICARBONATO DE SODIO GRADO FINO + CARBONATO DE SODIO ANHIDRO	2.15 g + 0.5 g / 5 g	POLVO EFERVESCENTE	No superar la dosis recomendada.
107	BICARBONATO DE SODIO + ALGINATO DE SODIO	125 mg + 133.5 mg / 5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
108	BICARBONATO DE SODIO + SULFATO DE MAGNESIO	2.3 g + 0.9 g / 5 g	POLVO EFERVESCENTE PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
109	CARBONATO DE CALCIO	780 mg	TABLETAS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
110	BICARBONATO DE SODIO + ÁCIDO CÍTRICO + CARBONATO SODICO	2.3 g + 2.19 g + 0.45 g / 5 g	POLVO EFERVESCENTE PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
111	ESOMEPRAZOL	20 mg	CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA	Indicado solo en caso de hiperacidez gástrica por corto tiempo (1 a 3 días)
112	HIDROTALCITA	500 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
113	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO + SIMETICONA	520 mg + 480 mg + 40 mg / 5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar en menores de 15 años. Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana. No administrar en personas con estreñimiento.
114	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO + SIMETICONA	520 mg + 480 mg + 40 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No administrar en menores de 15 años. Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana. No administrar en personas con estreñimiento.
115	HIDROXIDO DE MAGNESIO	480 mg / 5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No usar de manera crónica. No usar como laxante en niños.
116	HIDROXIDO DE MAGNESIO + OXIDO DE MAGNESIO	1.08 g + 4.68 g / 8 g	POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL	No administrar en menores de 15 años. Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana. No administrar en personas con estreñimiento.

117	MAGALDRATO + SIMETICONA	400 mg + 30 mg / 5 mL	SUSPENSION	Evitar el uso prolongado. Si persisten los síntomas buscar atención médica.
118	MAGALDRATO + SIMETICONA	800 mg + 40 mg	COMPRIMIDOS MASTICABLES	Si persisten los síntomas buscar atención médica.
119	OMEPRAZOL	20 mg	CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA	Indicado solo en caso de hiperacidez gástrica por corto tiempo (1 a 3 días)
120	RANITIDINA	150 mg	TABLETAS	Indicado solo en caso de hiperacidez gástrica por corto tiempo (1 a 3 días)
FÓRMULAS PARA REHIDRATACIÓN ORAL				
121	CLORURO DE SODIO + CLORURO DE POTASIO + CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO + CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO + ÁCIDO LÁCTICO + HIDRÓXIDO DE SODIO + GLUCOSA	Cada 100 mL contiene: Cloruro de Sodio 0.012 g + Cloruro de Potasio 0.149 g + Cloruro de Calcio Dihidratado 0.030 g + Cloruro de Magnesio Hexahidratado 0.041 g + Ácido Láctico 0.252 g + Hidróxido de Sodio 0.090 g + Glucosa 5.000 g	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
122	CLORURO DE SODIO + CLORURO DE POTASIO + MONOHDRATO DE DEXTROSA (EQUIVALENTE A DEXTROSA) + CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO + SUCRALOSA	Cloruro de Sodio USP 0.263 g + Cloruro de Potasio USP 0.150 g + Monohidrato de Dextrosa USP 1.485 g Equivalente a Dextrosa 1.35 g + Citrato de Sodio Dihidratado USP 0.294 g + Sucralosa USP 13.8 mg	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
123	CLORURO DE SODIO + CITRATO DE POTASIO MONOHDRATADO + GLUCONATO DE ZINC + GLUCOSA MONOHDRATADA + CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO	Cloruro de Sodio 207.600 mg + Citrato de Potasio Monohidratado 216 mg + Gluconato de Zinc 6.100 mg + Glucosa Monohidratada 2.5 mg + Citrato de Sodio Dihidratado 94 mg / 100 mL	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
124	DEXTROSA ANHIDRA + ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO + CITRATO DE POTASIO + CLORURO DE SODIO + CITRATO DE SODIO	Cada 100 mL contienen: Dextrosa Anhidra 2.500 g + Ácido Cítrico Anhidro 0.246 g + Citrato de Potasio 0.216 g + Cloruro de Sodio 0.205 g + Citrato de Sodio 0.098 g	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
125	DEXTROSA + FRUCTOSA + CLORURO DE SODIO + CITRATO DE POTASIO	Dextrosa 2.000 g + Fructosa 0.500 g + Cloruro de Sodio 0.204 g + Citrato de Potasio 0.220 g	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
126	DEXTROSA MONOHDRATADA + CLORURO DE SODIO + CLORURO DE POTASIO + CLORURO DE CALCIO + CLORURO DE MAGNESIO + LACTATO DE SODIO	Cada 100 mL Contiene: Dextrosa Monohidratada USP 5 g + Cloruro de Sodio USP 15 mg + Cloruro de Potasio USP 150 mg + Cloruro de Calcio USP 29 mg + Cloruro de Magnesio USP 40 mg + Lactato de Sodio USP 314 mg	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
127	OTRAS SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	Según fórmula OMS: Por cada litro (1000 mL) Cloruro de Sodio 2.6 g + Glucosa Anhidra 13.5 g + Cloruro de Potasio 1.5 g + Citrato Trisódico 2.9 g	POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL / SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones, presenta fiebre o datos de deshidratación; acudir al médico.
HIPNÓTICOS Y SEDANTES				
128	MELATONINA	3 mg	CÁPSULAS	Produce somnolencia.
LAXANTES				
129	GLICERINA	1.2 g / SUPOSITORIO NIÑOS	SUPOSITORIO	No usar en menores de dos años.
130	GLICERINA	2.4 g / SUPOSITORIO ADULTOS	SUPOSITORIO	No usar en menores de dos años.
131	LACTULOSA	3.33 g / 5 mL	SOLUCIÓN ORAL	En caso de efecto terapéutico insuficiente después de varios días de tratamiento, se aconseja consultar al médico.
132	PICOSULFATO DE SODIO	10 mg	TABLETAS	No superar la dosis recomendada.
133	POLIETILENGLICOL 3350	100 g / 100 g	SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
LUBRICANTES Y DESCONGESTIVOS OFTALMOLÓGICOS				

134	CARBOMER	2.50 mg / g	GEL OFTÁLMICO	No superar la dosis recomendada.
135	CARBOMERO + MANITOL	0,150 g + 4,600 g / g	GEL OFTÁLMICO	No superar la dosis recomendada.
136	CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA	10mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
137	CLORHIDRATO DE TETRAHIDROZOLINA+ SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO + HIPROMELOSA	0.015 mg + 0.075 mg + 0.06 mg / gota	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
138	CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA + HIPROMELOSA	1 mg + 5 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
139	EXTRACTO DE CAMOMILA	0.25 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
140	HIDROXIPROPIL GUAR	6 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
141	HIDROXIPROPIL METIL CELULOSA + DEXTRAN	3 mg + 1 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
142	HIPROMELOSA	5 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada
143	HIALURONATO DE SODIO	4 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada
144	NAFAZOLINA	1 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
145	NAFAZOLINA + POLISORBATO 80	0.0036 mg + 0.06 mg / gota	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
146	POLIETILENGLICOL 400 + PROPILENGLICOL	4.0 mg + 3.0 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada. Si persisten los síntomas buscar atención médica.
147	SULFATO DE CONDROITINA + HIALURONATO DE SODIO	1.8 mg + 1 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
148	SULFATO DE CONDROITINA + HIPROMELOSA	1.0 mg + 2.0 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
149	TETRAHIDROZOLINA	0.50 mg / mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Uso en niños mayores de 6 años. No superar la dosis recomendada, si persisten los síntomas consulte a su médico. No utilizar en pacientes con glaucoma.
MICROORGANISMOS ANTIDIARREÍCOS				
150	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII	2 Millardos (2 Billones)	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
151	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII	2 Billones / 5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
152	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	170 mg / 100 g	POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
153	LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG	5X (10 ⁹ -10 ¹⁰) UFC / 2 g	POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
154	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	170 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
155	SACCHAROMYCES BOULARDII	200 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
156	SACCHAROMYCES BOULARDII	250 mg / Sobre	POLVO PARA SUSPENSIÓN / SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
MUCOLÍTICOS				
157	AMBROXOL CLORHIDRATO	30 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días, se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
158	AMBROXOL CLORHIDRATO	30 mg / 5 mL	SOLUCIÓN ORAL / JARABE	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días, se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
159	AMBROXOL CLORHIDRATO	7.5 mg / mL	SOLUCIÓN ORAL GOTAS	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días, se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
160	AMBROXOL CLORHIDRATO	75 mg	CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días, se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
161	BROMHEXINA CLORHIDRATO	8 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CÁPSULAS BLANDAS	No usar en menores de 2 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
162	BROMHEXINA CLORHIDRATO	8 mg / 5mL	JARABE	No usar en menores de 2 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS				
163	ÁCIDO BENZOICO + ÁCIDO SALICILICO	100 mg + 200 mg / 5 g	UNGÜENTO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
164	ACIDO SALICILICO + ÁCIDO LÁCTICO	0.167 g + 0.167 g / mL	SOLUCIÓN TOPICA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
165	ACIDO SALICILICO + MENTOL + TIMOL	1 g + 0.20 g + 0.010 g / 100 mL	SOLUCIÓN TOPICA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.

166	MINOXIDIL	5 g / 100 mL	SOLUCIÓN TÓPICA	Usar con precaución en pacientes cardiopatas medicados y en aquellos pacientes que utilicen los inhibidores de la PDF5 (Sildenafil y sustancias relacionadas)
167	PENTOSANO POLISULFATO SODICO	1 mg / g	POMADA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
PREPARADOS DE USO NASAL				
168	CLORURO DE SODIO	70 mg / mL	SOLUCIÓN NASAL / SOLUCIÓN SPRAY NASAL / SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN	En caso de sospecha de infección o si los síntomas persisten luego de 48 horas, acudir al médico.
169	HIPROMELOSA	89.9 g / 100 g	AEROSOL PARA INHALACION	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
170	OXIMETAZOLINA	0.50 mg / mL	SOLUCIÓN NASAL	No usar en menores de 6 años. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
171	OXIMETAZOLINA + DEXPANTENOL	0.50 mg + 20.33 mg / mL	SOLUCIÓN NASAL	No usar en menores de 6 años. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
172	POLISORBATO 80 + GLICEROL 85% + CLORURO DE SODIO + SORBATO DE POTASIO + EDETATO DE SODIO	0.20 g + 0.30 g + 0.90 g + 0.15 g + 0.05 g / 100 g	SPRAY NASAL	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
173	XILOMETAZOLINA	1 mg / mL	SOLUCIÓN NASAL / SOLUCIÓN NASAL SPRAY DOSIFICADOR	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.
PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS				
174	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA	20%	GEL	Solo uso tópico. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
175	EXTRACTO DE FLUIDO DE RUIBARBO + ÁCIDO SALICÍLICO	50 mg + 10 mg / mL	SOLUCIÓN TÓPICA	No superar la dosis recomendada.
176	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	0.12 g / 100 mL	SOLUCIÓN BUCAL	Solo uso tópico. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y QUEMADURAS				
177	ACETATO DE ALUMINIO	3 mg / 5 mL (0.060 g / 100 mL)	LOCIÓN	Si persisten los síntomas luego de la dosis recomendada busque atención médica.
178	ACETATO DE CALCIO + SULFATO DE ALUMINIO	36.45 g + 51.80 g / 100 g	POLVO PARA SOLUCIÓN TÓPICA	No observaciones
179	CALCIO CARBONATO	90 g / 100 g	POLVO	No superar la dosis recomendada, no usar en problemas renales sin autorización médica.
180	EXTRACTO DE CENTELLA ACUÁTICA	2 g / 100 g	POLVO / CREMA TÓPICA	No superar la dosis recomendada
181	EXTRACTO DE CENTELLA ASIÁTICA + NEOMICINA SULFATO + HIDROCORTISONA	1 g + 0.6 g + 1 g / 100 g	CREMA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
182	SULFADIAZINA DE PLATA	1 g / 100 g	CREMA / POLVO	No ingerir, uso tópico.
183	SULFADIAZINA DE PLATA + PRAMOXINA + ÓXIDO DE ZINC + VITAMINA A + VITAMINA E	10 mg + 10 mg + 100 mg + 250 U.I. + 30 U.I / g	CREMA TÓPICA	No ingerir, uso tópico.
PREPARADOS PARA LA GARGANTA				
184	ALFA - AMILASA	3000 U.CEIP	TABLETAS / COMPRIMIDOS GRAGEADOS	No superar la dosis recomendada.
185	ALFA - AMILASA	1000 U CEIP / 5 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.
186	BENZOCAINA + CLORURO DE DEQUALINIO	10 mg + 0.25 mg	PASTILLAS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
187	BENZOCAINA + CLORHEXIDINA DIHIDROCLORURO	2 mg + 5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
188	CLORURO DE OXIBUPROCAINA + CLORURO DE CETILPIRIDINO	0.20000 mg + 1.00000 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO				

189	ACEITE ESENCIAL DE GOMENOL	20%	LÍQUIDO	No superar la dosis recomendada.
190	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + AMANTADINA CLORHIDRATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO	Hasta 500 mg + 50 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	La amantadina deberá usarse con precaución en pacientes con disfunción hepática. Se han observado en algunos casos un aumento de las transaminasas. La amantadina puede producir insomnio. La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento y en pacientes que no tengan insuficiencia hepática. Su uso puede afectar el sueño y el reposo normal.
191	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + DEXCLORFENIRAMINA MALEATO	100 mg + 0.5 mg / mL	SOLUCIÓN ORAL GOTAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas, acudir a su médico o a una unidad de salud.
192	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + FENILEFRINA HCL + CETIRIZINA DICLORHIDRATO	325 mg + 5 mg + 5 mg / 5 mL	JARABE	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días persisten los síntomas, acuda a su médico o a la unidad de salud mas cercana.
193	ACETAMINOFÉN + FENILEFRINA HCL + MALEATO DE CLORFENIRAMINA	500 mg + 5 mg + 2 mg	CAPLETAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días persisten los síntomas, acuda a su médico o a la unidad de salud mas cercana.
194	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + FENILEFRINA CLORHIDRATO + CETIRIZINA DICLORHIDRATO	Hasta 500 mg + 10 mg + 5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS / CÁPSULAS / POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.
195	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CLORFENIRAMINA MALEATO + (DXTROMETORFANO BROMHIDRATO Ó BROMHEXINA CLORHIDRATO) + FENILEFRINA CLORHIDRATO	Hasta 500 mg + 5 mg + (30 mg Dextrometorfano ó 8 mg Bromhexina) + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS / CÁPSULAS / POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas, acudir a su médico o a una unidad de salud.
196	ACETAMINOFÉN + BROMHIDRATO DE DXTROMETORFANO + DOXILAMINA SUCCINATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO	325 mg + 10 mg + 6.25 mg + 5 mg	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.

197	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + GUAIFENESINA + CLORFENIRAMINA MALEATO + FENILEFRINA + (DEXTROMETORFANO ó BROMHEXINA)	Hasta 125 mg + 100 mg + 5 mg + 5 mg + (15 mg Dextrometorfano ó 4 mg Bromhexina) / 5 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.
198	ACETAMINOFÉN + ÁCIDO ASCÓRBICO + BITARTRATO DE FENILEFRINA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA	162 mg + 30 mg + 3.89 mg + 1 mg	TABLETAS EFERVESCENTES	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas, acudir a su médico o a una unidad de salud.
199	ACETAMINOFÉN + FENILEFRINA + SALICILAMIDA + CLORFENIRAMINA + CAFEÍNA	500 mg + 10 mg + 100 mg + 3 mg + 10 mg	CAPLETAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas, acudir a su médico o a una unidad de salud.
200	ACETAMINOFÉN + BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA + GUAIFENESINA	250 mg + 10 mg + 5 mg + 200 mg	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas, acudir a su médico o a una unidad de salud.
201	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO	Hasta 500 mg AAS + 2 mg + 15 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas, acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
202	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + FENILEFRINA BITARTRATO	500 mg AAS + 5 mg + 15 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas, acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
203	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO + BITARTRATO DE FENILEFRINA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA	500 mg + 8 mg + 2 mg	TABLETAS EFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas, acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

204	DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA	12.50 mg + 5 mg / 5 mL	JARABE	Produce sedación. No administrar a niños menores de 12 años. Por la fenilefrina usar con precaución en hipertensos y cardiopatas. Si los síntomas persisten, consultar a su médico.
205	LORATADINA / FENILEFRINA	5 mg + 5 mg / 5 mL	JARABE	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico. No usar en hipertensos y cardiopatas.
206	LORATADINA / FENILEFRINA HCl	5.0 mg + 30 mg	TABLETAS DE LIBERACIÓN SOSTENIDA	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico. No usar en hipertensos y cardiopatas.
207	MENTOL + ALCANFOR USP + GOMENOL + ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO	0.250 g + 3.000 g + 2.000 mL + 4.000 mL / 100 mL	SOLUCIÓN INHALANTE	No ingerir.
208	MENTOL + EXTO. FLUIDO DE TOLU + BENJUI + EUCALIPTO + GOMENOL	1 g + 10mL + 10 mL + 10 mL + 1 mL / 100 mL	SOLUCIÓN INHALANTE	No ingerir.
PRODUCTOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR				
209	ALCANFOR		POMADA / CREMA	No ingerir.
210	ALCANFOR + TREMENTINA + MENTOL + ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO + TIMOL		UNGÜENTO	No ingerir.
211	GLUCOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA + METIL SUFONIL METANO	500 mg + 400 mg + 300 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
212	GLUCOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO	1500 mg + 1200 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
213	IBUPROFENO + VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + IBUPROFENO	Hasta 400 mg de Ibuprofeno + 50 mg + 100 mg + 100 mcg	CAPLETAS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
214	MENTOL + ALCANFOR + SALICILATO DE METILO	1.76 g + 5.86 g + 7.23 g / 100 g	CREMA	No ingerir.
215	MENTOL + SALICILATO DE METILO	2.857 g + 18.240 g / 100 g	CREMA	No ingerir.
216	MENTOL		UNGÜENTO / CREMA	No ingerir.
217	MENTOL + SALICILATO DE METILO + EUCALIPTOL		UNGÜENTO / CREMA	No ingerir.
PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMÁTICOS				
218	ACIDO FLUFENAMICO + ACIDO SALICILICO + POLIESTER MUCOPOLISACARIDO DEL ACIDO SULFURICO	3 g + 2 g + 0.2 g / 100 g	GEL	Solo uso topico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
219	CLONIXINATO DE LISINA	125 mg	CÁPSULAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS	No usar en menores de 18 años. No superar la dosis recomendada.
220	DICLOFENAC DIETILAMONIO	Hasta 2.32 %	AEROSOL / GEL	Solo uso tópico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
221	DICLOFENAC DIETILAMONIO + MENTOL + SALICILATO DE METILO	1.2 g + 4 g + 3 g / 100 g	GEL	Solo uso tópico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
222	DICLOFENAC SÓDICO	50 mg	TABLETAS	No superar la dosis recomendada ni prolongar su uso. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
223	DICLOFENAC + VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12	50 mg + 50 mg + 50 mg + 1,000 mcg	COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada ni prolongar su uso. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
224	DICLOFENAC SÓDICO	1 g / 100 g	GEL TÓPICO	Solo uso tópico. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
225	IBUPROFENO	10 g / 100 g	GEL	Si persisten los síntomas busque ayuda médica.
226	IBUPROFENO	400 mg	CAPLETAS / GRAGEAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS / CÁPSULAS	No usar conjuntamente con otros analgésicos, su uso prolongado puede producir problemas gastrointestinales o hepáticos. No ingerir más de 1,200 mg al día.
227	IBUPROFENO	100 mg	SUPOSITORIO	No usar conjuntamente con otros analgésicos, su uso prolongado puede producir problemas gastrointestinales o hepáticos.

228	IBUPROFENO	50 mg / mL	GOTAS ORALES EN SUSPENSIÓN	No usar en niños menores de dos años. En los niños mayores de dos años no usar por más de 48 horas. Puede producir problemas gastrointestinales, renales y hepáticos.
229	IBUPROFENO + N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA	400 mg + 20 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS	No usar en niños menores de 2 años. Puede producir problemas gastrointestinales, renales y hepáticos.
230	NAPROXENO SÓDICO	275 mg	CÁPSULAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS	Uso en mayores de 12 años. Puede incrementar riesgo de problemas hepáticos, renales y gastrointestinales. No usar conjuntamente con otros analgésicos, sin prescripción médica.
231	NAPROXENO SODICO + DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO	220 mg + 25 mg	CÁPSULAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS	Uso en mayores de 12 años. Puede incrementar riesgo de problemas hepáticos, renales y gastrointestinales. No usar conjuntamente con otros analgésicos, sin prescripción médica.
232	NAPROXENO SÓDICO	5.5 g / 100 g	GEL TÓPICO	Uso en mayores de 16 años, la dosis maxima es de 600 mg. Puede incrementar riesgo de problemas hepáticos, renales y gastrointestinales. No usar conjuntamente con otros analgésicos, sin prescripción médica.
233	PIROXICAM	0.5 g / 100 g	GEL	Si persisten los síntomas, buscar atención médica.
SUPLEMENTOS MINERALES				
234	ACETATO DE CALCIO	700 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
235	CALCIO GLUCONATO	600 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
236	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3	1500 mg + 400 UI	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS / CÁPSULAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
237	CARBONATO DE CALCIO + OXIDO DE MAGNESIO + SULFATO DE ZINC	834.0 mg + 220.5 mg + 12.35 mg	TABLETAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
238	CITRATO DE CALCIO	1500 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS / CÁPSULAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
239	CITRATO DE CALCIO + VITAMINA D3	1500 mg + 400 UI	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CAPLETAS / CÁPSULAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
240	CITRATO POTÁSICO	1080 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	No superar la dosis recomendada. No usar con problemas renales o cardíacos sin prescripción médica.
241	FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO	5.0 g / 100 g	GRANULADO	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
242	FUMARATO FERROSO + ÁCIDO FÓLICO + CIANOCOBALAMINA (B12)	325 mg + 800 mcg + 50 mcg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
243	GLUCONATO FERROSO	300 mg / 10 mL	SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
244	HIERRO COMO COMPLEJO DE HIERRO III	100 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.

245	HIERRO + ZINC + COBRE + ACIDO FOLICO + VITAMINA B12 + VITAMINA B6	HIERRO 24 mg (como Fumarato Ferroso 73.0 mg) + ZINC 12 mg (como Sulfato de Zinc Monohidrato 32.9 mg) + COBRE 2 mg (como Sulfato de Cobre seco 5.6 mg) + Folacina (como Ácido Fólico 500.0 ug) + VITAMINA B12 10 ug (Como Cianocobalamina) + VITAMINA B6 (Como Piridoxina Clorhidrato 5.0 mg)	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
SUPRESORES DE LA TOS Y EXPECTORANTES				
246	CARBOXIMETILCISTEINA + DEXTROMETORFANO + CLORFENIRAMINA	150 mg + 5.0 mg + 2.5 mg / 5 mL	JARABE	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
247	DEXTROMETORFANO	15 mg / 5 mL	JARABE	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
248	DEXTROMETORFANO	30 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
249	DEXTROMETORFANO + GUAIFENESINA	30 mg + 200 mg	CAPLETAS	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico.
250	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + CLORFENIRAMINA MALEATO	30 mg + 4 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si después de 3 días persisten los síntomas o empeoran, acudir a un médico.
251	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + MIEL DE ABEJA + CLORFENIRAMINA	15 mg + 350 mg + 5 mg / 5 mL	JARABE	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico.
252	GUAIFENESINA	200 mg / 12.5 mL	JARABE	No recomendado durante el embarazo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
253	GUAIFENESINA	100 mg / 7.5 mL	JARABE	No recomendado durante el embarazo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

254	GUAIFENESINA + ACETAMINOFEN	20 mg + 300 mg	SUPOSITORIO	No superar la dosis recomendada.
255	SULFOGUAYACOLATO + DEXTROMETORFANO + CLORFENIRAMINA	150 mg + 5mg + 2 mg / 5mL	JARABE	No usar en niños menores de 2 años. Si después de 3 días persisten los síntomas o empeoran, acudir a un médico.
256	BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + SULFAGUAYACOLATO DE POTASIO + BROMHEXINA HCL	12.5 mg + 2 mg + 100 mg + 4 mg / 5mL	JARABE	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.
TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA				
257	SILIMARINA	200 mg	TABLETA / COMPRIMIDO / CÁPSULA / GRAGEA	No superar la dosis recomendada.
VASOPROTECTORES				
258	RUSCUS ACULEATUS + ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + LACTOBACILLUS SPOROGENES	20.00 mg + 40.00 mg + 8.300 mg	TABLETA / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superrar la dosis recomendada.
VITAMINAS				
259	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO + EXTRACTO DE MALTA	No debe exceder el 150% de la dosis diaria recomendada	EMULSIÓN	No superar la dosis recomendada.
260	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO + VITAMINA E	No debe exceder el 150% de la dosis diaria recomendada	CÁPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
261	ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO EQUIVALENTE A VIT. A + ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO EQUIVALENTE A VIT. D3 + VITAMINA A PALMITATO EQUIVALENTE A VIT. A + VITAMINA D3 + FOSFATO TRIBÁSICO DE CALCIO + FOSFATO MONOBÁSICO DE CALCIO	630 UI + 63 UI + 501 UI + 50.1 UI + 0.0935 g + 0.0546 g / 100 mL	EMULSIÓN	No superar la dosis recomendada.
262	ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO + VITAMINA A PALMITATO + VITAMINA D	ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0.4567 g + VITAMINA A 1331,25 UI + VITAMINA D 1331,25 UI / 100 mL	EMULSIÓN	No superar la dosis recomendada.
263	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)	2000 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES / CÁPSULAS / COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica.
264	ÁCIDO ASCORBICO + ASCORBATO DE SODIO	220 mg + 336 mg	TABLETAS MASTICABLES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica.
265	ACIDO ASCORBICO + CARBONATO DE CALCIO	1000 mg + 600 mg	TABLETAS EFERVESCENTES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica. Tratamiento de estados carenciales de vitamina C, en adultos y adolescentes a partir de 14 años.
266	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + ZINC	1000 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / TABLETAS MASTICABLES / COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica. Tratamiento de estados carenciales de vitamina C, en adultos y adolescentes a partir de 14 años.
267	ÁCIDO FÓLICO	5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
268	ÁCIDO FÓLICO	5 mg / 5 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.
269	ÁCIDO FÓLICO + VITAMINA B12	5 mg + 500 mcg / 10 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.
270	MECOBALAMINA	500 mcg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
271	VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12	50 mg + 50 mg + 200 mcg / 15 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.

272	VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12	100 mg + 100 mg + 200 mcg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTOS / CÁPSULAS / CAPLETAS	No superar la dosis recomendada.
273	VITAMINA B12 + ÁCIDO FÓLICO	0.50 mg + 5.0 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
274	VITAMINA B12 + ÁCIDO FÓLICO	250 mcg + 2.5 mg / 5 mL	SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
275	VITAMINA E (ALFATOCOFERIL ACETATO)	400 UI	CÁPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
276	VITAMINA D3 + VITAMINA C + ZINC	200UI + 30mg + 2.5 mg	GOMITAS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
277	GINKGO BILOBA + GINSENG PANAX + VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA B3 + VITAMINA B12 + VITAMINA E + NICOTINAMIDA + FOSFATO TRICALCICO + MANGANESO SULFATO + ZINC SULFATO	30 mg + 25 mg + 5 mg + 0.2 mg + 1 mg + 1 mcg + 75.0 UI + 15 mg + 160 mg + 1 mg + 1 mg	CÁPSULA	Usar con precaución en pacientes que utilicen medicamentos antiagregantes plaquetarios.
278	SILIMARINA + VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA B3 + VITAMINA B5 + VITAMINA B12	140 mg + 5 mg + 5 mg + 1.5 mg + 25 mg + 7.5 mg + 5mcg	CÁPSULA	No superar la dosis recomendada.
279	VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS EN COMBINACIÓN	Vitamina A 2,664 UI + Vitamina B1 3 mg + Vitamina B2 3.4 mg + Vitamina B6 4 mg + Vitamina B12 2.2 mcg + Vitamina C 70 mg + Vitamina D 400 UI + Vitamina E 10 mg + Nicotinamida 17 mg + Ácido Fólico 600 mcg + Calcio 125 mg + Hierro 30 mg + Zinc 15 mg	CÁPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
280	VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS EN COMBINACIÓN	Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.050 mg + Tiamina HCl (Vit. B1) 10 mg + Piridoxina HCl (Vit. B6) 10 mg + L-Lisina HCl 300 mg + Nicotinamida 25 mg + L-Glutamina 25 mg + D-Pantenol 15 mg / 5 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.
281	OTRAS VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS EN COMBINACIÓN	No debe exceder el 150% de la dosis diaria recomendada	TABLETAS / COMPRIMIDOS / JARABE / SOLUCIÓN ORAL / POLVO	No superar la dosis recomendada.
PRODUCTOS NATURALES				
282	ALOE VERA + ACEITE DE EUCALIPTO + BERRO + RABANO + MENTA + CEBOLLA + MIEL	40 mg + 2 mg + 4 mg + 4 mg + 20 mg + 50 mg + 200 mg / 5mL	JARABE	No superar la dosis recomendada
283	COLA DE CABALLO (EQUISETUM ARVENSE)	500 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
284	CENTELLA ASIÁTICA	500 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
285	EXTRACTO DE COLA DE CABALLO, EXTRACTO DE SAW PALMETTO, EXTRACTO DE ACHIOTE, EXTRACTO DE TOMATE, EXTRACTO DE JENGIBRE, EXTRACTO DE CEBOLLA, VITAMINA B6, B12, VITAMINA E Y SULFATO DE ZINC	13.0 mg + 50.0 mg + 15.0 mg + 25.0 mg + 7.5 mg + 15.0 mg + 2.5 mg + 8.0 mcg + 1.0 UI + 0.5 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
286	EXTRACTO DE GINKGO BILOBA	80 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	No superar la dosis recomendada. No usar conjuntamente ácido acetilsalicílico o cualquier otro antiplaquetario, para evitar el riesgo de sangrado.
287	EXTRACTO ESTANDARIZADO DE GINKGO BILOBA	40 mg / mL	SOLUCIÓN GOTAS	No superar la dosis recomendada. No usar conjuntamente ácido acetilsalicílico o cualquier otro antiplaquetario, para evitar el riesgo de sangrado.
288	EXTRACTO HOJA DE HIEDRA DESECADA (HEDERA HELIX)	7.0 mg / mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.
289	EXTRACTO FLUIDO DE COLA DE CABALLO, EXTRACTO FLUIDO DE SAW PALMETTO, EXTRACTO FLUIDO DE ACHIOTE, EXTRACTO FLUIDO DE TOMATE, EXTRACTO DE JENGIBRE, EXTRACTO DE CEBOLLA, VITAMINA B6, B12, VITAMINA E Y SULFATO DE ZINC	7.5 mg + 25.0 mg + 6.25 mg + 11.5 mg + 7.5 mg + 3.75 mg + 1.25 mg + 4.0 mcg + 0.5 mg + 0.5 mg	JARABE	No superar la dosis recomendada
290	EXTRACTO NORMALIZADO DE LA CORTEZA DE PINUS PINASTER [PINO MARÍTIMO] PYCNOGENOL	60 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada

291	EXTRACTO SECO DE ANAMU (PETIVERIA ALLIACEA; RAIZ)	500 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
292	EXTRACTO SECO DE CHANCA PIEDRA, EXTRACTO SECO DE BARBAS ELOTE, EXTRACTO SECO DE COLA DE CABALLO, EXTRACTO SECO DE CEBOLLA, EXTRACTO SECO DE ABEDUL	400.0 mg + 90.0 mg + 75.0mg + 50.0 mg + 30.0 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
293	EXTRACTO SECO DE CASCARA DE NARANJA + EXTRACTO SECO DE GUARANÁ + EXTRACTO SECO DE ACAI BERRY + EXTRACTO SECO DE TÉ VERDE + EXTRACTO SECO DE CHITOSAN + L-CARNITINA	200 mg + 50 mg + 100 mg + 100 mg + 100 mg + 100 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
294	EXTRACTO SECO DE SAW PALMETTO (SERENOA REPENS) ORIGEN VEGETAL, PARTE USADA: HOJAS	320 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada
295	GOTU KOLA	500 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
296	PSYLLIUM HUSK (CÁSCARA DE SEMILLA DE PLANTAGO PSYLLIUM)	5.8 g	POLVO PARA SUSPENSIÓN	No superar la dosis recomendada.
TODOS LOS DEMAS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS				
297	AGUA ESTERIL		SOLUCIÓN ESTERIL	No observaciones